

LYMDIARAL® + LYMDIARAL® + LYMDIARAL®

FIALE INIETTABILI confezione da 10 fiale
GOCCE ORALI confezione da 20 e 50 ml
POMATA USO ESTERNO confezione da 40 e 100 g

Nel trattamento combinato ed efficace dei disturbi di regolazione del sistema linfatico superficiale e profondo.

LYMDIARAL® FIALE

1 fiala da 2 ml contiene:

Conium D3	2,5 mg
Hydrastis D3	2,5 mg
Phytolacca Ø	7,5 mg
Asterias rubens D3	2,5 mg
Viscum album D2	2,5 mg
Scilla D1	2,0 mg
Eccipienti:	
Sodio cloruro	
Acqua per iniettabili	
Non contiene glutine	

COMPOSIZIONE

LYMDIARAL® GOCCE

100 g contengono:

Taraxacum Ø	8 g
Calendula Ø	4,5 g
Arsenicum album D8	1 g
Chelidonium D2	0,5 g
Leptandra Ø	0,3 g
Echinacea Ø	0,3 g
Phytolacca D2	0,2 g
Carduus marianus D1	0,2 g
Condurango D2	0,1 g
Hydrastis Ø	0,1 g
Lycopodium D2	0,1 g
Sanguinaria Ø	0,1 g
Contiene 39 Vol-% alcool	
Non contiene glutine	

LYMDIARAL® POMATA

100 g contengono:

Conium Ø	4 g
Colchicum e seminibus Ø	0,1 g
Podophyllum Ø	0,03 g
Mercurius bijodatus trit. D5	0,1 g
Stibium sulfuratum nigrum trit. D1	0,1 g
Calendula Ø	2 g
Eccipienti:	
- Acqua purificata	
- Alcool cetostearilico emulsionante	
- Oleum petrae	
- Etanolo	
- Oleiloleato	

INDICAZIONI

Drenaggio linfatico, linfatisma, ipertrofia ghiandolare, come coadiuvante per via mesoterapica nella cellulite, nelle artrosinoviti malleolari e nella terapia pre e post operatoria in oncologia.

Linfatisma, diatesi essudativa, malattie croniche-recidivanti, linfangiti, linfoadeniti, scrofalosi, edemi post-traumatici, post chirurgici e da radiazioni, mastectomie, svuotamento ascellare, stripping venosi, immobilizzazioni ortopediche.

Linfopatie acute e croniche, linfo-venostasi, linfadeniti, linfangiti, edemi post-traumatici, edemi postchirurgici e da radiazioni.

POSOLOGIA

Se non prescritto diversamente, nelle forme acute una fiala da 2 ml, fino a 3 volte al giorno, i.v., i.m. oppure s.c. Nelle forme ad andamento cronico una fiala da 2 ml, al giorno, i.v., i.m. oppure s.c.
In Medicina Estetica: 1-2 fiale per ogni applicazione mesoterapica, da solo o in cocktail, 1-2 volte ogni settimana.

Adulti: 10 gocce 3 volte al di in poca acqua.
Bambini 6-12 anni: 6-7 gocce 3 volte al di in poca acqua.
Lattanti e prima infanzia: 4-5 gocce 3 volte al di in poca acqua.

Applicare 2-3 cm. di pomata 1-3 volte al di sulla parte interessata, con leggero massaggio

CONTRO INDICAZIONI

Non note.

Ipersensibilità alle Composite.
 Non utilizzare in caso di malattie come TBC, leucemia, collagenosi, S.M., AIDS, infezioni HIV e altre malattie autoimmuni.

Non utilizzare in gravidanza e durante l'allattamento.

EFFETTI COLLATERALI

Nessuno osservato ad oggi. Durante l'infusione endovenosa potrebbero verificarsi reazioni di ipersensibilità al componente Viscum album e calo pressorio.

Non noti per LYMDIARAL® Gocce.
 In casi isolati, l'Echinacea ha causato eruzioni cutanee, prurito, tumefazioni al viso, difficoltà respiratorie, vertigini e ipotensione.

In casi molto rari, l'applicazione della pomata può dar luogo ad eruzioni cutanee pruriginose, che scompaiono con la sospensione dell'applicazione.

INTERAZIONI CON ALTRI MEDICAMENTI

Non note.

Non note.

Non note.

- BIBLIOGRAFIA:** 1) V. Gasbarro, A. Cataldi - Unità Operativa di Chirurgia Vascolare, Arcispedale S. Anna - Ferrara: "Modificazioni morfologiche dei linfonodi in corso di trattamento con Lymdiaral®". *Medicina Funzionale* n°4 (2001) pag. 2-4.
 2) F. Albergati, M.G. Menegon, L. Turatello, P.A. Bacci: "Valutazione degli effetti microcircolatori dopo terapia della Matrice Extracellulare in pazienti affette da flebolinfedema degli arti inferiori". *Atti Congresso Naz. Med. Est. S.M.I.E.M. (1999)* pag. 60-62.
 3) P.A. Bacci, *Le celluliti: Il protocollo BIM.ED* ed. Alberti & C. Editori.
 4) C. Lazzarini: *La Medicina Funzionale Estetica* - Named.

STRETTAMENTE RISERVATO ALLA CLASSE MEDICA

LYMDIARAL® Fiale

IN MEDICINA ESTETICA

È IL CUORE INTERVENTO MESOTERAPICO NELLA TERAPIA A MATRICE EXTRACELLULARE

IL MICROCIRCOLO RISULTA SEMPRE COMPROMESSO A VARI LIVELLI
E DEVE ESSERE CONSIDERATO COME BASE DI OGNI TRATTAMENTO

LYMDIARAL® Fiale AGISCE SUI DISTURBI DELLA PERMEABILITÀ MIGLIORANDO
L'ATTIVITÀ METALLO-PROTEASICA DEL DISTRETTO, OTTIMIZZANDO
IL RAPPORTO PROTEOGLICANI/GLUCOSOAMMINOGLICANI

COLLI DI MEDICINA FUNZIONALE REGOLATORIA IN MEDICINA ESTETICA:

5 MESOTERAPICI LYMDIARAL® Fiale COPRE LE SEGUENTI PATOLOGIE:

- INSUFFICIENZA LINFATICA E MICROCIRCOLATORIA
- LINFEDIEMI
- LINFOSTASI
- LINFOVENOSTASI

COMPLETANO L'AZIONE DI LYMDIARAL® Fiale:

- ALLYA® PASCOE Fiale Quadro infiammatorio
- VENO® PASCOE Fiale Azione flebotonica
- STRONGLIFE® PASCOE Fiale Antisicotico-antiacidotico
- PASCONEURAL® PASCOE Fiale Neuralterapia della cellulite

Via...
33
50 Lesmo (Mi)
039 698501
039 6985030
mail: info@named-srl.it



PASCOE
NATURMEDIZIN

FOL 0018 BIS/02-GT